

BAREM CORECTARE VARIANȚĂ ①

SUB. 1 - 10p.

Enumerați metodele de aplicare a desinfectorilor pe suprafețele și obiectelor medicale. - 10p.

- a) sterilizare - 2,5p.
- b) pulverizare - 2,5p
- c) imersie - 2,5p
- d) nebulizare - 2,5p

SUB. 2. - 10p.

Care sunt codurile de culoare ale recipientilor în care se colectază deseurile rezultante din activitatea medicală? - 10p

- a) galbenă - pentru deseurile medicale periorale, astfel cum sunt deseurile la art. 7 și clasificate la art. 8. - 5p.
- b) negru - pentru deseurile supraventile, astfel cum sunt deseurile la art. 7.

SUB. 3 - 15p.

Care sunt regulele generale de practică alegătoare? - 15p.

- a) desinfecție completă curățare, dar nu susținere și nu poate fi numită sterilizare - 3p.
- b) pentru desinfecție în locuri să fie legate desinfectorii în cutii de documente și adăugați agenții păstrări tehnici sau presupuse - 3p.
- c) ateliere de desinfecție respectând

Instrumente de protecție a muncii, care să prevină accidentele și intoxicația. - 3p

d) personalul care utilizează în mod curat dezinfectantele tehnice înaintea aplicării la muncă procedură sau la muncă trebuie desfășurate - 3p.

e) în preșere măsporile care se efectuează operațiunile de curățare și dezinfecție tehnice și există în mod obligatoriu un grăbiejnic sau, în ceea ce personalul respectiv va fi registrata numărul operațiuni, ora de efectuare și conformată muncă se mărturizează; personalul tehnic să amioale de numărul dezinfectantului utilizat, datele preparației soluției de lucru și numărul de afluviu, precum și concentrația de lucru. - 3p.

Sub. b + 10p

Toate cele condiții trebuie respectate pentru prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante. - 10p.

a) amioalarea, și respectarea exactă a concurenței ale lucrului în funcție de materialul supus dezinfectării - 2p

b) folosirea de râșinute curte - 2p

c) utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și efectuată, conform unei bune practici medico-tehnice, pentru a se evita contaminarea și degradarea sau lăsatularelor - 2p

d) respectarea numărului de contact și sprijinutul produsului; - 2p.

c) este întregile ambele coree disipate în spumă de desinfecție. - 2p.

Surs. 5: - 20 p.

Ce include măsurile standard pentru prevenirea și hîntarea infecțiilor asociate cu actelor medicale

1. igienea mânălor, care este esențială pentru a reduce riscul de răspândire a infecțiilor. Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată. În fază de hîncare dinice, cu excepția cazurilor când măsurile sunt vizibile sau răcoroase: sfugă sau fluidul biological), sau după extinserea pacientului cu infecție cu Clostridium difficile sau rotavirus, sfingere în care trebuie utilizate apă și săpun. - 4p.

2. utilizarea echipeamentului individual de protecție, în funcție de expunerea anticeste. Igiena mânălor este justificată numai la sfingere după realizarea și cheucerea echipeamentului. - 4p.

3. practici și figuri de injecțare, proceduri specifice pentru a preveni transmisările bolilor infecțioase de la un pacient la altul sau între un pacient și persoană nel medicală. În primul răspundere și administrarea medicamentelor de uz percutanal - 4p.

4. menținerea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale sau conținuturilor suprafetelor potențial contaminate din

(4)
imediate aproape a pacientului, proceduri specifice pentru prevenirea, monitorizarea bolilor infecțioase; de la un pacient la altul sau într-un pacient și personal medical întrupur manipulația "edipsicamente" medicală și contactul cu obiectele sau suprafețele din mediciu; - 4p.

5. Igienă respiratorie și efecte de tip colectiv al precauțiilor standard care se adresează în primul rând pacientilor și persoanelor sarcină cu împotriva bolii de boala infecțioasă respiratorie care se aplică în cadrul unei plăsoare cu simptome manifestate cauză lată în unitatea sanitată. Acest efect al precauțiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a infecțiilor respiratorii și trebuie aplicate la lezarea în unitatea sanitată. - 4p.

Su.B. 6 - 20p

Care sunt procedurile aplicate pentru igienă medicală, în funcție de nivelul de risc?

Nivel de risc:

- minim -

- intermediar

Proceduri aplicate

- peleră simplă cu apă și săpun - 4p.

- dezinfectare, igienă prin spălare cu soluție hidroalcoolică - 4p.

- dezinfectare igienică prin spălare cu apă și săpun - 4p -

Nivel de sănătate

- înalt

Procedură "dezinfecție"

(5)

- dezinfecție chirurgicală a mânuselor pentru spălare cu săpun hidroalcoolice (apă+zece alcooluri se face pe mână uscată) - 4p.
- dezinfecție chirurgicală a mânuselor pentru spălare cu apă și săpun. Chirurgical, ușinată de către cu apă și săpun și sterilizare cu prosop steril - 4p.

SUB. 7 - 10 p.

7) sterilitate, dezinfecție și decontaminare și cum reiese din ORD. 1781/2021

a) Cirurgie - etape preliminare obligatorie, formularul și sistemele în cadrul dezvoltării bolnavului sau procedură de îndepărțire a mușelilor de pe suprafata sau obiecte, prin operării mecanice sau termice, utilizându-se agentii fizici și/sau chimici care se efectuează în anumite situații de ordin și astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optimale de securitate - 4p

b) dezinfecție - procedură de obținere a majorității microorganismelor patogene sau nefagoane de pe obiecte suprafete, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici - 3p

c) de contaminație - procesul de neutralizare/ îndepărțare a unor substanțe periculoase sau redicative, inclusiv a microorganismelor adunăte de pe un obiect, o suprafață sau perete și, după înportarea în dezinfecție și sterilizare.

Sub. P - 5P.

- Producătorul arăgătoare în anumite situații
nu poate să fie de acord cu ceea ce este să se întâmple;
- Sunt același substanțe active / preparate conținând
nu mai multă substanță activă, care dă un
plus la produs ca și că arăgătoare!