

# Bardem de erectare

Varianța nr. 1.

Proba scrisă pentru ocuparea posturilor de  
sufreniere/debutante - #77.

1. Definiți curățarea.

Curățarea este etapa preliminară de ligatură, permanentă și sistematică în cadrul curății activității sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materiale organice și anorganice) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin metode mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici, care se efectuează în unități sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de sterilitate.

2. Ce este antisepsia?

Antisepsia - produsul biocid care are în vedere dezinfecția, se distruge microorganismele la nivelul tegumentelor/mucoselor intacte pentru prevenirea sau limitarea infecțiilor.

3. Ce este dezinfectia de nivel înalt?

Dezinfectia de nivel înalt este procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni.

4. Definiți dezinfectia - procedura care se aplică numai după curățare și este urmată de clătire, după caz.

5. Care sunt nivelurile de dezinfectie?

Nivelurile de dezinfectie sunt:

- dezinfectie de nivel înalt
- dezinfectie de nivel intermediar
- dezinfectie de nivel scăzut

6. Cum se realizează igiena mâinilor?

Spălarea simplă igienică a mâinilor se face utilizându-se apă și săpun lichid; această procedură nu este un substitut pentru dezinfectia igienică a mâinilor.

7. Unde este obligatoriu dezufectiv de unel mult?

- sectiile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile.
- situatia evolutiei unor cazuri de infectii asociati asistentei medicale.
- situatiile de risc epidemiologic.
- sectiile cu risc inalt: sectiile unde sunt anstati pacienti imunodeprimati, arn, neonatologie, prematur, sectiile unde se practica grefe/transplant, sectiile de neurologie.
- blocul operator, blocul de nastere
- sectiile de reanimare, terapie intensiva
- serviciile de urgenta, ambulanta, locul unde se suzala injuria

8. Definitia Testului de sterilitate (ce este?)

Testul de sterilitate - testul efectuat pentru controlul sterilitatii a instrumentarului si a altor materiale sanitare prin procedura de sterilizare fizica si chimica.

9. Componentele unui sistem de supraveghere pentru monitorizarea infectiilor asociate asistentei medicale sunt:

- obiective specifice bine definite pentru fiecare tip de unitate sanitara, respectiv pentru fiecare sectie.
- perioada de timp precizata, definita pentru fiecare structura cu rol in supraveghere: sectii, laborator, alte structuri ale unitatii.
- indicatori de performanta monitorizabili
- populatia supraveghata definita
- tipurile de infectii supraveghate
- frecventa si durata raportarii
- metoda de colectare a datelor
- asigurarea confidentialitatii
- analiza continua a datelor.

10. Enumerați măsurile standard pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale:

- igiena mâinilor
- utilizarea echipamentului individual de protecție (ex: măști, măști, protecție facială)
- practici sigure de injecție, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea bolilor infectioase de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul preparării și administrării medicamentelor de uz paravascular
- manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale sau contactul cu suprafețele potențial contaminate din imediata apropiere a pacientului.
- igiena respiratorie.

11. Definiția colectării deșeurilor.

Colectarea deșeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a deșeurilor, incluzând separarea deșeurilor pe categorii, la sursă și stocarea temporară a deșeurilor în vederea transportării acestora la o instalație de tratare sau de eliminare a deșeurilor.

12. Deșeurile interfoare - foietoare sunt obiecte ascuțite care pot produce lezuni mecanice prin tăiere sau străpungere; aceste deșeurii sunt considerate deșeurii infectioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase.

13. Producătorul de deșeurile medicale este orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități medicale din care rezultă deșeurile medicale; Spatiul central de stocare temporară a deșeurilor medicale reprezintă un amplasament de stocare temporară a deșeurilor medicale, amenajat în incinta unității care le-a generat, destinat exclusiv stocării temporare a deșeurilor până la momentul la care acestea sunt evacuate în vederea eliminării;

14. Codul ptr. deșeurile produse chimice urgente și amurgamice pericoluase este: 18.04.07. chimicale; altele decât cele specificate la 18.04.06\*

15. Spatiul central de stocare a deșeurilor trebuie să aibă două compartimente:

a) un compartiment ptr. deșeurile pericoluase, prevăzute cu dispozitive de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate;

b) un compartiment ptr. deșeurile pericoluase, amenajat conform Normelor de igienă și recomandărilor privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr 536/1997, cu modificările și completările ulterioare.

16. Infirmiera din unitățile sanitare are următoarele atribuții:

- a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură
- b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

17. Sacii de culoare galbenă se folosesc în pubele, pentru a fi cu capace sau cutii de carton, după caz, cutii de plastic și să fie cu capac ptr. colectarea deșeurilor pericoluase codificate 18.04.02, 18.01.03\* în art.8 din anexa nr.1 la ordin.

18. Pentru colectarea deșeurilor interpretare - tăietoare codificate 18.01.01, 18.01.03<sup>\*</sup> se folosesc:  
- cutitele cu perete îngust

19. Prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoanele aflate în situații similare pe baza raselor, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, afilierii politice sau antipatice personale

20. Prin îngrijirea terambinală se înțelege: îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognosticului fatal a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.