


17.10.2025.

Barane de creștere

Subiectul nr. 1

Culegerea datelor

- stare de agitație
- contracții uterine dureroase, ritmice, cu frecvență și intensitate crescândă
- modificări la nivelul colului (scurtare, ștergere, dilatare) ajungând la dilatație completă (10-11 cm)



Primipară


Col

nemodificat

parțial
scurtat

scurtat și
dilatat

aproape
complet
dilatat



Multipară

Scurtarea și dilatația apar
simultan

punga
apelor

- formarea pungii apelor, ruperea membranelor
- apariția senzației de screeamă
- bătăile cordului fetal prezente

20 p

Subiectul nr. 2

8.3.1. Semnele preeclampsiei	Premergător eclampsiei apare adesea un sindrom neuromuscular de alarmă, care constă în: • cefalee persistentă și intensă, • dureri epigastrice sub formă de bară, • vărsături, • tulburări senzoriale: amețeli, vâjâituri în urechi, diplopie (vedere dublă), uneori amauroză tranzitorie (pierderea vederii prin spasme vasculare), • astenie cu stare de somnolență, alteori stări de agitație, polipnee. Precizare. Aceste simptome apar pe lângă triada de bază a disgravidiilor (gestozelor): 1) edemele 2) hipertensiunea arterială (care în această fază poate ajunge la 150 mmHg minimă și peste 200 mmHg maximă) 3) proteinuria (albuminuria).
-------------------------------------	--

20p

Barium de overetare

Subiectul nr. 3.

Secolarea prematură a placentei normal
inserată - Simptomatologie.

207

8.2.2.2. Simptomatologie

Dezlipirea prematură a placentei este un accident brutal, care survine în plină sănătate aparentă, spre sfârșitul sarcinii sau în cursul travaliului.

În formă majoră gravă:

- durere violentă în abdomen cu instalare bruscă, cu iradieri lombo-sacrate,

- contractură tetaniformă a uterului ("uter de lemn"). Uter mărit mai mult decât vârsta reală a sarcinii. Creșterea înălțimii fundului uterului.

- hemoragie redusă: sânge a cărui culoare variază de la roșu la negricios (semn inconstant). Hemoragia este un semn inconstant. În cazurile așa-zise "interne" hemoragia poate lipsi complet.

- semnele disgravidiei prezente: hipertensiune, edem, albumină,

- zgomotele inimii fătului nu se mai aud,

- colul este închis sau dehiscent (deschis), iar segmentul inferior dureros și în tensiune lemnoasă,

- semne generale:

- pierderea cunoștinței,

- agitație sau prostrație, anxietate,

- paloare extremă, transpirații reci,

- sete accentuată,

- tulburări de simț (văz, auz),

- puls filiform, hipertensiune, apoi hipotensiune,

- oligo-anurie, stare de șoc.

17. 10. 2025

Barom de erectare

4. Definiti urmatorii termeni:

- dezinfecție de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni;
- decontaminarea - procesul de neutralizare/îndepărtare a unor substanțe periculoase sau radioactive, inclusiv a încărcăturii microbiene de pe un obiect, o suprafață sau persoană; etapă importantă în dezinfecție și sterilizare.

- 20 p.

17.10.2025.

Barou de creștere

5. Dezinfecția mainilor - Nivelul de risc minim

Proceduri aplicate - Spălare simplă cu apă și săpun

Indicații - - când mâinile sunt vizibil murdare; ✓

- la începutul și sfârșitul programului de lucru;

- după utilizarea grupului sanitar; ✓

- în caz de contact cu produse biologice;

- în cazul pacienților cu infecție cu *Clostridioides difficile*.

- 20 p