

Concurs pentru ocuparea a 7 posturi Infirmiere din cadrul secției Oncologie, Obstetrica-Ginecologie, Boli Infectioase, Ortopedie, Dializa, Gastroenterologie și Bloc Operator Chirurgie din cadrul SJU Alexandria

03.02.2025

BAREM

1. Ce categorie de deseuri se incadreaza la Codul 18.01.03*? Enumerati 25 puncte

Deșeurile infecțioase, respectiv deșeurile care conțin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatorii, mănuși, sonde și alte materiale de unică folosință, comprese, pansamente și alte materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, scutece care provin de la pacienți internați în unități sanitare cu specific de boli infecțioase sau în secții de boli infecțioase ale unităților sanitare, cadavre de animale rezultate în urma activităților de cercetare și experimentare etc.

2. Care este durata stocarii temporare a deseuriilor medicale infecțioase în incintele unitatilor medicale? 25 puncte

Durata stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale nu poate să depășească un interval de 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.

3. Ce tipuri de dezinfecție se aplică în funcție de nivelul de risc? 25 puncte

- În funcție de nivelul de risc, se aplică următoarele tipuri de dezinfecție:

- a) dezinfecție de nivel înalt;
- b) dezinfecție de nivel intermediar;
- c) dezinfecție de nivel scăzut.

4. Când este indicată spalarea simplă cu apă și sapun a mâinilor? 25 puncte

- când mâinile sunt vizibil murdare;
- la începutul și sfârșitul programului de lucru;
- după utilizarea grupului sanitar;
- în caz de contact cu produse biologice;
- în cazul pacienților cu infecție cu Clostridioides difficile